




BOLETIN RESUMEN MENSUAL DE NOTIFICACIONES OCTUBRE 2014


La distribución de las notificaciones recibidas (n= 541) en el mes de OCTUBRE, según la procedencia de los datos es la siguiente:

- Unidades Funcionales para la Gestión de Riesgos (AE): 220 (40,67%)
- Unidades Funcionales para la Gestión de Riesgos (DA): 286 (52,87%)
- Oficinas de Farmacia de la RFC: 35 (6,47%)



Tipo de error	% (n=541)
Error en la dosis: omisión o incorrecta	29,07%
Selección inapropiada del medicamento	24,63%
Frecuencia de administración errónea	7,22%
Duplicidad de medicamentos o utilización de fármacos innecesarios	5,19%
Se prescribe un fármaco que no suministra los distribuidores	5,00%
Error en la preparación	4,81%
Medicamento deteriorado	4,07%
Forma farmacéutica errónea	3,70%
Se prescribe un medicamento que no está comercializado	2,78%
Paciente equivocado	2,22%
Falta de cumplimiento del paciente	1,67%
Duración del tratamiento incorrecta	1,67%
Error administrativo, subsanable por el farmacéutico	1,48%
Prescripción y/o utilización de fármacos fuera de indicación	1,48%
Error en el envase prescrito o dispensado	1,11%
Monitorización insuficiente del tratamiento	0,93%
Técnica de administración errónea	0,93%
Prescripción y/o utilización de fármacos contraindicados en ficha técnica	0,93%
Velocidad de administración incorrecta	0,56%
Vía de administración incorrecta	0,37%
Hora de administración incorrecta	0,19%
Total general	100,00%

Consecuencias para el paciente	% (n= 541)
El error se produjo, pero no alcanzó al paciente	29,81%
El error llegó al paciente, pero no le produjo daño	29,26%
Circunstancias o eventos con capacidad de causar error	19,26%
El error llega al paciente pero no se administra	10,74%
El paciente requirió monitorización y/o intervención aunque no se produjo daño	5,00%
El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	3,52%
El error se ha producido, pero no se ha podido hacer seguimiento y conocer el daño	1,48%
El paciente ha precisado o prolongado la hospitalización	0,56%
Se ha requerido intervención para mantener la vida del paciente	0,19%
Total general	100,00%



NOTIFICACIONES CON CONSECUENCIAS DE DAÑO (REMITIDAS AL CENTRO DE FARMACOVIGILANCIA DE LA CM)

Symbicort 160 mg	Se prescribe Symbicort (budesonida, formoterol fumarato dihidrato) 1-0-1, cuando ya tomaba Seretide (fluticasona propionato, salmeterol) 1-0-1. La paciente toma ambos fármacos simultáneamente.
Carvedilol 6,25 mg	Se prescribe Carvedilol 6.25 mg, y en la Farmacia dispensan de 25 mg. El paciente acude a urgencias por astenia.
Nervinex®	Paciente en tratamiento con Xeloda®. Acude a consulta médica por herpes zoster y se le pauta brivudina. Días después acude a urgencias hospitalarias por intolerancia oral y diarrea que requiere ingreso. El cuadro clínico sugiere deficiencia de DPD (dihidropirimidina deshidrogenasa) inducido por brivudina en paciente en tratamiento con Xeloda®, shock hemodinámico, pancitopenia severa y aspergilosis invasiva que le lleva a la muerte.
Metamizol 575 mg cap.	Paciente alérgica a Nolotil® (metamizol), se le entrega informe de alta donde consta dicha alergia y se le prescribe paracetamol, diclofenaco y omeprazol como tratamiento domiciliario, junto con las recetas de diclofenaco, metamizol y omeprazol. Pregunta si alguna es de Nolotil® y se le responden que no. Tras tomar la medicación, refiere haber tenido picor en el cuerpo y las manos, que no achacó al tratamiento por desconocer lo que estaba tomando.
Doxiciclina 100 mg gg.	Se administró doxiciclina de 100 mg, 1 gg al día como tratamiento para el acné. El médico no insistió en la forma de administración con lo que el paciente lo tomó en el momento de acostarse, para evitar olvidos. Al quinto día (5 comprimidos), el paciente comenzó con un cuadro clínico compatible con esofagitis que resolvió al cuarto día con la suspensión del fármaco, administración de tratamiento al respecto. Se ha suspendido definitivamente el fármaco hasta la completa de recuperación.
Hidroferol ampollas	Paciente con Insuficiencia Renal crónica, en tratamiento con Hidroferol® 1 ampolla cada 15 días desde hace más de un año. En la Farmacia detectan que se estaba administrando 1 cada 24 horas.
Tryptizol 25 mg 24 comp.	Paciente desplazada que no recordaba su tratamiento y confundió Tromalyt® con Tryptizol® y se administro 6 comp. La paciente estaba mareada y lenta de reflejos, pero cedió en 24 horas.
Metilprednisolona 40 y 20 mg vial	Paciente con DM tipo I, que tras sufrir una picadura de insecto acude urgencias del centro de salud y le pautan Urbasón 60 mg vía IM y Polaramine®. La paciente indica que es diabética pero le dicen que no pasa nada. Al poco tiempo se encuentra mal y realiza glucemia con valor de 500 mg/ml. Se administra insulina rápida y no bajan las cifras. Requiere atención hospitalaria.
Antibiótico	Paciente alérgico a levofloxacino que se lo administran en la urgencia a pesar de haber advertido su mujer que era alérgico. Cuando la mujer acude a su médico de familia para que le expenda la receta, el médico se da cuenta del error. El paciente ya había tomado un comprimido y le produjo inflamación de labios y urticaria generalizada.
Durogesic Matrix	Paciente en tratamiento con fentanilo transdérmico (Durogesic®) por mala tolerancia a la morfina vía oral. Necesita dosis extras excesivas y comienza con efectos secundarios. Se advierte que se encuentra el parche de fentanilo lo tiene despegado.

ALGUNOS POSIBLES DEFECTOS DE CALIDAD REMITIDOS AL SERVICIO DE CONTROL FARMACÉUTICO (CF)

Vacuna gripe	Embolo roto, al abrir la vacuna precintada no había fragmentos en su interior.
Influvac 1 jeringa precargada 0,5 ml suspensión inyectable	No se puede administrar porque la aguja está curvada.
Proderma 100 mg cap.	El medicamento llega con dos prospectos en el interior de la caja, sin <i>blister</i> con cápsulas.
Ziprasidona Kern Pharma 40 mg cap. duras EFG.	La caja contiene dos prospectos pero sin <i>blister</i> con el fármaco.

ALGUNOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO COMUNICADOS EN EL PORTAL DE USO SEGURO DE MEDICAMENTO

CALCIO PIDOLATO 3750 (500 MG CA) 30 SOBRES	EUTIROX 25 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS , 84 COMPRIMIDOS
VERNIES 0,4MG 30 COMP. SUBLINGUALES	M-M-RVAXPRO POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 VIAL + 1 JERINGA
VIMPAT 50 MG 14 COMP. RECUB CON PELIC	BACTROBAN 2% 15 G POMADA
KREON 25.000, 50 CAPSULAS	PREVENCOR 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Para acceder al LISTADO DE MEDICAMENTOS CON PROBLEMAS DE SUMINISTRO:
<http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscarDesabastecidos>

NOTAS REMITIDAS A LA AEMPS

PLUMAS DE INSULINA	Se presentan en cajas con 5 plumas en su interior, si se abre la caja no se puede garantizar la seguridad de las plumas incluidas ya que no disponen de precinto de seguridad. Esto no es un problema para la dispensación en oficinas de farmacia, pero si en los Hospitales ya que la dispensación es unitaria (plumas individuales). Se propone incluir precinto de seguridad para cada pluma
MEDEBIOTIN FUERTE SOLUCION INYECTABLE, 10 ampollas de 1 ml (p.a.: Biotina).	En el acondicionamiento primario de la ampolla se indica el volumen 1 ml, pero no su equivalencia en mg. Esto puede dar lugar a un error de administración ya que, las dosis se pautan en mg/día y varían según la edad del paciente y patología. Se propone incluir la composición en mg en el acondicionamiento primario.