

MEDICAMENTO IMPLICADO

HIDROFEROL 0,266 mg, ampollas bebibles

En los meses de octubre y noviembre de 2014 hemos tenido conocimiento de 3 errores de medicación, procedentes de la misma Unidad Funcional para la Gestión de Riesgos de Atención Primaria, que coinciden tanto en la etapa en la que se producen como en las consecuencias en el paciente.

Cada ampolla de Hidroferol contiene 0,266 mg (266 microgramos) de Calcifediol (15.960 UI de vitamina D) y está **indicado**, en adultos, en los casos de deficiencia de vitamina D y en las siguientes situaciones: osteodistrofia renal y problemas óseos inducidos por tratamiento con fármacos corticoides.

Fuente: ficha técnica (http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/53683/FT_53683.pdf)

Posología y forma de administración:

- *Osteodistrofia renal: Se recomienda la toma de una ampolla bebible (0,266 mg de calcifediol) **cada 5-6 días**.*
- *Problemas óseos inducidos por fármacos corticosteroides: Se recomienda la toma de una ampolla bebible de 0,266 mg de calcifediol **al mes**.*

Fuente: ficha técnica (http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/53683/FT_53683.pdf)

Errores notificados:

ERROR 1: (fecha de notificación: 10/10/2014)

Paciente con insuficiencia renal crónica, en tratamiento con Hidroferol 0,266mg ampollas bebibles.

Posología: 1 ampolla/15 días desde hace más de un año.

Etapa: Administración por el paciente. Toma **1 ampolla/24 horas**.

¿Cómo se detecta?: En la oficina de farmacia al necesitar un envase (receta electrónica) antes de la fecha calculada según la pauta posológica correcta.

Consecuencias: El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica.

ERROR 2: (fecha de notificación: 14/11/2014)

Paciente con hipoparatiroidismo postquirúrgico e hipocalcemia persistente en tratamiento con Rocaltrol (calcitriol) y calcio oral.

Posología: 1 ampolla/ 15 días.

Etapa: Administración por el paciente. Toma **1 ampolla/24 horas** (durante 7-10 días).

¿Cómo se detecta?: En la consulta médica al presentar el paciente astenia, debilidad, crisis hipertensivas y estreñimiento pertinaz.

Consecuencias: El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica.

ERROR 3: (fecha de notificación: 27/11/2014)

Paciente en seguimiento en consulta de Medicina Interna, en tratamiento con Hidroferol por déficit leve de vitamina D.

Posología: 1 ampolla/ 15 días durante 3 meses

Etapa: Administración por el paciente. Toma **1 ampolla/24 horas**

¿Cómo se detecta?: La paciente acude a consulta dos días después por cefalea tensional, malestar inespecífico. Es remitida a urgencias realizándose estudio analítico con calcio normal y es dada de alta con diagnóstico de sobreingesta de vitamina D.

RECOMENDACIONES A PROFESIONALES

- Insistir en los pacientes en el cumplimiento correcto de la posología de este medicamento.
- Asegurarse de que el paciente ha entendido las instrucciones facilitadas (verbales o por escrito) haciéndole repetir las para mayor seguridad.

Agradecimientos al notificador (DA SUR) y a la UFR-DA SUR